FORTÉ PHARMA LABORATOIRES Medical
Una compañía de Reig Jofre

REIG JOFRE

**CAJA 30 COMPRIMIDOS**
**C.N. 193012.5**

## Articolageno Nativo Plus

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

### 3 efectos en 1 comprimido: Nutre, protege y mantiene las articulaciones activas

*La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos

**BOTE 30 DOSIS**
**Sabor neutro C.N. 178836.8**

**BOTE 30 DOSIS**
**Sabor limón C.N. 184039.4**

## Articolageno

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

### Articulaciones, músculos y huesos**

*La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos

**BOTE 30 DOSIS**
**Sabor neutro C.N. 178836.8**

**BOTE 30 DOSIS**
**Sabor limón C.N. 184039.4**

## Hialsorb Cold

PRODUCTO SANITARIO

### Alivia el dolor y la inflamación en lesiones de los tejidos blandos

Cumple con la normativa de productos sanitarios. No aplicar en heridas abiertas, en ojos o en mucosas. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Sólo para uso externo.

**CAJA 30 CÁPSULAS**
**C.N. 239296.0**

## Tendoactive

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

### Fórmula única para tendones y ligamentos. El aliado en la recuperación del tendón

# Complementos Alimenticios y Productos Sanitarios

## ARTICOLAGENO NATIVO PLUS

Caja con 30 comprimidos
Sabor limón: C.N. 184039.4
Sabor neutro: C.N. 178836.8

### Cuidado intensivo: movilidad y flexibilidad

### 3 efectos en 1 comprimido: nutre, protege y mantiene las articulaciones activas

| Fórmula | | Dosis diaria en 1 comprimido |
|---|---|---|
| COLÁGENO NATIVO TIPO II (b-2Cool®) | Reduce la degradación del colágeno tipo II del cartílago<br>Reduce el dolor y la inflamación articular [1-3] | 40 mg |
| ÁCIDO HIALURÓNICO (Mobilee®) | Efecto lubricante: mejora la movilidad y la flexibilidad<br>Aumenta la fuerza muscular en un 17% [4-7] | 80 mg |
| CÚRCUMA | Contribuye a mantener el bienestar articular [8] | 200 mg |
| VITAMINA C | Contribuye a la formación de colágeno | 20 mg |

### RECOMENDACIONES

Indicado para:

- **Personas con molestias articulares**
  - Deportistas
  - Mujeres mediana edad
  - Tercera edad

**POSOLOGÍA**

- Tomar 1 comprimido al día preferiblemente en ayunas
- Tomar con 1 vaso de agua
- Mínimo durante 3 meses

**1** Mannelli et al. Osteoporos Int (2015) 26(Suppl 1): 71.P366. **2** Scarpellini M, et al. J Orthopaed Traumatol 2008; 9: 81-7. **3** Bakilan F, et al. Eurasian J Med. 2016 Jun;48(2):95-101. **4** Torrent A, et al. Osteoarthritis Cartilage. 2009;17(1):S278-279. **5** Tamer TM. Interdiscip Toxicol. 2013 Sep;6(3):111-25. **6** Martinez-Puig D, et al. Mediterr J Nutr Metab.2013;6:63-68. **7** Sánchez J et al. Genes Nutr. 2014 Sep;9(5):417. **8** Perkins K, et al. J Evid Based Complementary Altern Med. 2017 Jan;22(1):156-165.

## ARTICOLAGENO

Bote con 30 dosis
Sabor limón C.N. 184039.4
Sabor neutro C.N. 178836.8

### Cuidado básico: articulaciones, músculos y huesos

| Fórmula | | Dosis diaria en 1 cacito |
|---|---|---|
| COLÁGENO HIDROLIZADO | Proteína que contribuye al mantenimiento de cartílagos, huesos y músculos [1-3] | 10 g |
| ÁCIDO HIALURÓNICO (Mobilee®) | Efecto lubricante: mejora la movilidad y la flexibilidad<br>Aumenta la fuerza muscular en un 17% [4-7] | 40 mg |
| MAGNESIO | Mantenimiento de huesos y buen funcionamiento de los músculos [8-9] | 132 mg |
| VITAMINA C | Contribuye a la formación de colágeno | 25 mg |

### RECOMENDACIONES

Indicado para:

- Deportistas
- Mujeres mediana edad
- Tercera edad

**POSOLOGÍA**

- 1 cacito al día
- Tomar con 1 vaso de agua
- Mínimo durante 3 meses

**1** Benito-Ruiz, P. et al. Int. J. Food Sci. Nutr. 60, 99–113 (2009). **2** Moskowitz, R. W. Semin. Arthritis Rheum. 30, 87–99 (2000). **3** Oesser, S., et al. J. Nutr. 129, 1891–1895 (1999). **4** Torrent A, et al. Osteoarthritis Cartilage. 2009;17(1):S278-279. **5** Tamer TM. Interdiscip Toxicol. 2013 Sep;6(3):111-25. **6** Martinez-Puig D, et al. Mediterr J Nutr Metab.2013;6:63-68. **7** Sánchez J et al. Genes Nutr. 2014 Sep;9(5):417. **8** Stahlmann, R. et al. Antimicrob. Agents Chemother. 39, 2013–2018 (1995). **9** Shakibaei, M. et al. Toxicol. Pathol. 24, 580–587 (1996).

# Complementos Alimenticios y Productos Sanitarios

Crema tópica 100 ml
C.N. 177479.8

## HIALSORB COLD

### Alivia el dolor y la inflamación en lesiones de tejidos blandos

### RECOMENDACIONES

- **Alivia el dolor articular y muscular** de manera rápida y eficaz y reduce la inflamación.
- Indicado para **aliviar el dolor articular**, así como en caso de **torceduras, esguinces** y **sobrecargas musculares**
- **Actúa** también en **hematomas** y **reduce la hinchazón**

| Fórmula | | Dosis diaria en 100 ml |
|---|---|---|
| CONDROITÍN SULFATO | Propiedaddes antiinflamatorias[1] | 0,25% |
| ÁCIDO HIALURÓNICO | Propiedaddes antiinflamatorias[1] | 0,25% |
| MENTOL | Analgésico de origen natural[2] | |

**POSOLOGÍA**
Aplicar 2-3 veces al día
Masajear la zona a tratar hasta completa absorción

**1** Möller I, et al. Osteoarthritis Cartilage. 2013, 21 (Supple) S287:560. **2** Airaksinen, O. et al. The American Journal of Sports Medicine 2003, Vol 31, Nº5.

Caja de 60 cápsulas
C.N. 177479.8

## TENDOACTIVE

### Formulación específica para el tendón

### RECOMENDACIONES

Indicado para **tendones** y **ligamentos**

- Entre el 15% y el 30% de las tendinopatías provienen del **ámbito laboral**
- En el **deporte** representa entre el 30% y el 50% de las lesiones

| Fórmula [1-5] | | Dosis diaria en 2 cápsulas |
|---|---|---|
| COLÁGENO HIDROLIZADO TIPO I | Aporta resistencia y flexibilidad | 80 mg |
| CONDROITÍN SULFATO | Ordena y estructura las fibras de colágeno | 440 mg |
| VITAMINA C | Contribuye a la formación normal de colágeno | 60 mg |
| MANGANESO | Contribuye a la normal formación del tejido conectivo | 0,6 mg |

**POSOLOGÍA**
Tomar 2 cápsulas al día preferiblemente en una sola toma
Tomar con 1 vaso de agua
Periodo mínimo de 3 meses

**1** Shakibaei M, et al. Histol Histopathol. 2011;26(9):1173-85. **2** Torrent A, et al. Arthritis Rheumatol. 2011 Oct; 63(10); (Suppl.), P-1897:S720. **3** Nadal F, et al. Osteoarthritis Cartilage. 2009; 17 (S1): S253. **4** Arquer A, et al. Apunts Med Esport. 2014;49:31-6. **5** Balius R, et al. Curr Ther Res Clin Exp. 2016 Nov 18;78:1-7.