



## DATOS FARMACÉUTICOS

CN:  
699148 Estring 7,5 µg./24 h  
anillo vaginal

Más información:  
<http://goo.gl/oZtt2Y>



# HEMIHIDRATO DE ESTRADIOL

## INDICACIONES

Tratamiento de la **vaginitis atrófica** en las mujeres postmenopáusicas

## DESCRIPCIÓN DE PATOLOGÍA

Es una inflamación de la vagina por adelgazamiento del tejido y disminución en la lubricación por la falta de estrógenos. Aparece enrojecimiento, picor, sequedad vaginal, sangrado después de las relaciones sexuales, flujo vaginal leve, dolor vaginal. Produce propensión a las infecciones vaginales, úlceras o fisuras en la pared y relaciones sexuales dolorosas

## MECANISMO DE ACCIÓN

Hormona sexual con actividad estrogénica, Entra en la célula por difusión donde ejerce su acción al unirse a receptores específicos situados en el citoplasma y el núcleo. Modulan la transcripción génica y la síntesis proteica.

## POSOLOGÍA Y CONSIDERACIONES ESPECIALES

Una vez introducido el anillo se deja **90 días pasados los cuales habrá que cambiarlo**. Se colocará en el **tercio superior de la vagina**. Si presenta molestias persistentes o intensas, o movimiento excesivo del anillo, se le deberá retirar. Extraer si se va a administrar otro preparado vaginal.

En mujeres con tratamiento de THS cíclica se deberá completar el ciclo y cambiar en el primer día del cese de sangrado.

La duración máxima recomendada del tratamiento continuado es de dos años. Si existen signos de secreción vaginal anormal, molestias vaginales o sangrado vaginal deberá realizarse una exploración completa

## INTERACCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS

Contraindicaciones: Pacientes con tumores estrógeno-dependientes o historia de los mismos, hemorragia genital no diagnosticada o hiperplasia de endometrio no tratada, enfermedad hepática o antecedentes, porfiria, presencia o antecedentes de tromboembolismo venoso, trastornos trombofílicos conocidos

Afecciones que requieren supervisión: otosclerosis, epilepsia, asma, lupus, colestiasis, diabetes mellitus, hipertensión, fibroides uterinos o endometriosis. Requerirá una revisión del endometrio tras un año de tratamiento.

Interacciones: No son probables pero habrá que tener en cuenta que puede aumentar su metabolismo hepático las sustancias que induzcan las enzimas del citocromo P450.

## DATOS DE INTERÉS, REACCIONES ADVERSAS

**Retirada inmediata: ictericia o deterioro de la función hepática, aumento significativo de la presión arterial, aparición de cefalea de tipo migrañoso o embarazo.**

Reacciones adversas más frecuentes: **infecciones vaginales o de las vías urinarias, molestias abdominales, prurito generalizado, hiperhidrosis, molestias vulvovaginales, prurito genital**, Si aparece manchado o sangrado durante el tratamiento deberá ponerse en contacto con el médico.

## TERAPÉUTICA ACTUAL. VENTAJAS

Vagifem, Ovestinon, Blissel, Colpotrofin, hidratantes vaginales

Dosis bajas y sólo requiere una aplicación trimestral