



EDITORIAL: Adherencia terapéutica. Solos no se puede

La falta de adherencia terapéutica se ha convertido en una realidad tangible y es, hoy por hoy, uno de los principales retos que deben enfrentar los sistemas sanitarios para su buen funcionamiento. Este editorial, firmado por Jesús C. Gómez, presidente de SEFAC, analiza esta problemática que se traduce en que el 50% de los pacientes con enfermedades crónicas no cumple adecuadamente con sus tratamientos. En el editorial se exponen también algunos de los puntos del Plan de Adherencia al Tratamiento, en el que ha participado SEFAC junto con otras sociedades científicas, industria y plataformas de pacientes.

[Leer más](#)



ORIGINAL: Percepción de efectividad y seguridad de los fármacos de acción lenta para osteoartritis (SYSADOA) en el tratamiento de la artrosis desde la farmacia comunitaria

La osteoartritis es un proceso degenerativo articular que genera un dolor profundo, crónico y mal localizado. Los SYSADOA son fármacos de acción lenta que previenen el deterioro del cartilago, reducen el dolor y mejoran la función articular. El objetivo de este artículo es estudiar la percepción de efectividad y seguridad de los SYSADOA como tratamiento farmacológico de la artrosis. El estudio, de tipo observacional y transversal, se realizó en ocho farmacias comunitarias de Madrid entre los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016 mediante la realización de una encuesta estructurada.


[Leer más](#)



ORIGINAL: Uso de inhaladores: detección de errores e intervención por el farmacéutico comunitario

Los inhaladores son medicamentos que requieren un adiestramiento especial para su correcto uso. Conocer a los pacientes que los usan y evaluar cuáles son los errores que cometen puede ser el punto de partida para su abordaje y solución. El farmacéutico comunitario es clave en este sentido. El objetivo de este trabajo es conocer las variables sociodemográficas de los usuarios de inhaladores, analizar los errores en su uso e intervenir sobre los mismos. Asimismo, se pretende saber si perciben controlado su problema de salud y evaluar qué opinan sobre la actitud activa del farmacéutico.

[Leer más](#)



REVISIÓN: Indicación farmacéutica para el dolor lumbar en pacientes con diabetes y/o hipertensión arterial que acuden a la farmacia comunitaria

Mediante una revisión sistemática de Guías de Práctica Clínica (GPC) dirigidas al abordaje del dolor lumbar, así como de otras fuentes bibliográficas, este trabajo comprende una serie de recomendaciones sobre indicación farmacéutica a pacientes con diabetes y/o hipertensión arterial que acuden a la farmacia solicitando tratamiento farmacológico para dicho síntoma. Las recomendaciones específicas sobre tratamiento farmacológico fueron formuladas teniendo en cuenta su nivel de evidencia y revisando las posibles interacciones y/o contraindicaciones de los fármacos en los pacientes con hipertensión arterial y/o diabetes mellitus.

[Leer más](#)



REVISIÓN: Turn back crime. Medicamentos ilegales y papel del farmacéutico comunitario

El objetivo de este trabajo es describir y analizar la situación en España de los productos de venta ilícita, tanto medicamentos como complementos alimenticios, poniendo en conocimiento las principales acciones realizadas en los últimos meses y su contextualización a nivel mundial. Asimismo, se pretende alertar sobre la magnitud del problema y la importancia del papel del farmacéutico comunitario. Para ello, se realizó una búsqueda de información tanto a nivel nacional como internacional y se llevó a cabo un análisis descriptivo de las notas informativas publicadas en 2015 por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en la sección de medicamentos ilegales de uso humano.

[Leer más](#)



CASOS CLÍNICOS: Consulta farmacéutica por somnolencia en un lactante

Este artículo analiza el caso de un bebé de dos meses, en lactancia materna, sin patologías conocidas y sin tratamiento alguno. Su madre refiere que desde hace unos dos o tres días (no puede precisarlo) presenta somnolencia y duerme más de lo normal, saltándose alguna toma. No presenta fiebre ni ningún otro signo aparente. Siguiendo el protocolo de consultas en lactantes, se pregunta a la madre si se le ha prescrito algún tratamiento farmacológico o está usando algún medicamento sin receta, con el objetivo de decidir si es necesaria la derivación a urgencias de pediatría. [Leer más](#)

Ganas tú. Gana la Farmacia. Ganan los pacientes. Únete a SEFAC.

Si quieres asociarte a SEFAC hazlo ahora desde www.sefac.org y te enviaremos el paquete de bienvenida con nuestras principales publicaciones.